

Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila
Facultad “Dr. José Assef Yara”
Policlínico “Belkis Sotomayor Álvarez”



Título: Características clínico-epidemiológica asociados a la incidencia del cáncer de próstata en el Policlínico Belkis Sotomayor, 2018.

Autor: Dra. Heydi Pereyó Ramirez

Tesis para optar por el título de especialista de Primer Grado en
Medicina General Integral

Ciego de Ávila, 2019

Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila
Facultad “Dr. José Assef Yara”
Policlínico “Belkis Sotomayor Álvarez”



Título: Características clínico -epidemiológicas asociados a la incidencia del cáncer de próstata en el Policlínico Belkis Sotomayor, 2018.

Autor: Dra. Heydi Pereyó Ramirez

Aspirante a Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral

Tutor: Dra. Dagmari Albear de la Torres

Especialista de 1er grado en MGI

Máster en Procederes Diagnósticos en APS.

Profesor Asistente

Tesis para optar por el título de especialista de Primer Grado en Medicina General Integral

Ciego de Ávila, 2019

PENSAMIENTO

....El médico será algo más que alguien que atiende a uno que se enferma y va al hospital, sino que tendrá un papel especial en la medicina preventiva...en fin será un “Guardián de la Salud”.

Fidel Castro Ruz.

(1983)

RESUMEN

El cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en frecuencia de cáncer en hombres mundialmente. En Cuba se produce aproximadamente 570 muertes anuales. Se realizó un estudio analítico retrospectivo de casos y controles con el objetivo de identificar los posibles factores de riesgo asociados con la aparición del cáncer de próstata manifestado en pacientes del Policlínico Belkis Sotomayor en el período comprendido de enero a diciembre de 2018. El universo de estudio estuvo conformado por 962 pacientes, de los cuales se estudió 14 casos de Cáncer de Próstata diagnosticados por biopsia, en la selección de los controles, se eligieron tres pacientes por cada caso con características similares, aceptando formar parte del estudio a través del consentimiento informado. La información se obtuvo por medio de la historia clínica y por un cuestionario aplicado. En el análisis de los datos se utilizó la técnica de Chi cuadrado para determinar la presencia de asociación estadística entre variables cualitativas y se realizó en cálculo de estimación puntual de Odds ratio. Entre los principales resultados se encontraron que el cáncer de próstata es más frecuente después de los 60 años de edad y predominio color de la piel negra. Los Factores de Riesgo identificados fueron el hábito de fumar, el consumo de café, Hiperplasia prostática benigna, Antecedente Patológico Familiar de cáncer de próstata y la obesidad. Como factor protector resultó la vida sexual activa.

Palabras claves: Casos y controles, cáncer de próstata.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción _____	1-4
Marco Teórico _____	7-13
Material y Método _____	13-21
Análisis y Discusión de los resultados _____	21-39
Conclusiones _____	40
Recomendaciones _____	41
Revisión Bibliográficas _____	42