

**REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
POLICLÍNICO UNIVERSITARIO NORTE DE MORÓN
“DIEGO DEL ROSARIO PADILLA”**

**Caracterización de la población adolescente con adicción
al tabaco del consultorio médico de la familia 23 del área de
salud norte, Morón**

TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE: Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral.

AUTOR: Dr. Antonio de Jesús Camacho Romero. Residente de segundo año de medicina general integral.

MORÓN, 2017.

**REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
POLICLÍNICO UNIVERSITARIO NORTE DE MORÓN
“DIEGO DEL ROSARIO PADILLA”**

**Caracterización de la población adolescente con adicción
al tabaco del consultorio médico de la familia 23 del área de
salud norte, Morón**

TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE: Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral.

AUTOR: Dr. Antonio de Jesús Camacho Romero. Residente de segundo año de medicina general integral.

TUTOR: Dra. Amarilys de la C. Noda Espinosa. Especialista en primer grado en medicina general integral.

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA: Policlínico universitario docente Diego del Rosario.

MORÓN, 2017

RESUMEN

Se realizó una investigación del tipo observacional descriptiva con el propósito de caracterizar a la población adolescente con adicción al tabaco del consultorio médico de la familia (CMF) 23 del área de salud norte de Morón, el universo estuvo constituido por 64 pacientes adolescentes pertenecientes al consultorio antes mencionado y la muestra quedó conformada mediante muestreo no probabilístico intencional por 40 adolescentes fumadores comprendidos entre las edades de 12 a los 15 años a los que se les aplicó una encuesta obteniendo como resultado que la mayoría de la muestra estudiada fuma más de 10 cigarrillos al día, todos manifestaron conocer las consecuencias del hábito de fumar, 38 refirieron conocer los beneficios de no fumar. Las principales fuentes de información con respecto al tabaquismo fueron la escuela, la televisión, radio, folletos de salud y otros. Los motivos por los cuales decidieron comenzar el hábito de fumar fueron por creer que es bueno o por sentirse “hombre” o “mujer”, con un 25% y 22.5%, respectivamente. Se encontró una marcada influencia familiar ya que 30 de ellos refirieron tener uno o más familiares fumadores. El 100% fue consciente de que el hábito daña al que fuma, 25% reconoció que daña al que lo rodea y 67.5% consideró que daña a ambos. La principal edad de comienzo del hábito rondó los 13 años. En el 52.5% de los casos los padres financian el hábito. Esto constituye una preocupación para la comunidad donde se trabaja, por las consecuencias que trae aparejada esta adicción a constituirse puerta de entrada a otras drogas.

Palabras clave: Tabaquismo, adolescencia, cigarrillos, autocuidado.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Marco teórico.....	7
Materiales y métodos.....	21
Resultados y discusión.....	25
Conclusiones.....	31
Referencias bibliográficas.....	32