

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE CIEGO DE ÁVILA
HOSPITAL GENERAL DOCENTE DR. “ANTONIO LUACES IRAOLA”

TÍTULO: Utilidad del cerclaje uterino en gestantes con factores predisponentes de prematuridad por incompetencia cervical. Hospital General Docente Dr. “Antonio Luaces Iraola”. 2012 – 2016.

(TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE ESPECIALISTA DE PRIMER GRADO EN GINECOBSTERICIA)

AUTORA: Dra. Deyanira Prieto Rabí.

CIEGO DE ÁVILA, 2017

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE CIEGO DE ÁVILA
HOSPITAL GENERAL DOCENTE DR. “ANTONIO LUACES IRAOLA”

TÍTULO: Utilidad del cerclaje uterino en gestantes con factores predisponentes de prematuridad por incompetencia cervical. Hospital General Docente Dr. “Antonio Luaces Iraola”. 2012 – 2016.

(TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE ESPECIALISTA DE PRIMER GRADO EN GINECOBSTETRICIA)

AUTOR: Dra. Deyanira Prieto Rabí.

Especialista de 1er grado en MGI.

Residente de Ginecobstetricia.

TUTOR: Dr. Luis Alberto Rodríguez Rodríguez.

Especialista de Primer grado en Ginecobstetricia.

Máster en Atención Integral a la Mujer.

Profesor Asistente de la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila.

Ciego de Ávila, 2017

RESUMEN

Una causa frecuente de prematuridad es la incompetencia ístmico-cervical, su etiología es multifactorial y en un 90% de los casos aparecen antecedentes obstétricos. El cerclaje cervical, consiste en la reparación o cierre forzado de la parte alta del orificio cervical interno. Se realizó un estudio observacional descriptivo con el objetivo de Determinar la utilidad del cerclaje uterino en gestantes con factores predisponentes para parto prematuro por incompetencia cervical, para la reducción de la prematuridad. Hospital General Docente Dr. "Antonio Luaces Iraola". 2012 - 2016. Se realizó cerclaje a 21 gestantes, predominando el grupo de 20 a 35 años de edad, con el 80,9 %; entre las normopeso, con un 85,7 % y la escolaridad preuniversitaria, con 61,9 %. De los factores de riesgo relacionados con la historia ginecobstétrica anterior, predominó el antecedente de parto pretérmino con 9 casos y 14 con antecedente de aborto provocado. La mayor frecuencia de realización de cerclaje, el 71,4 %, fue entre las 21 a 26 semanas. Las modificaciones cervicales con 16 gestantes fue la causa predominante para la realización del mismo, y la prematuridad fue la morbilidad más frecuente. Mediante la realización del cerclaje uterino en gestantes con factores predisponentes para parto prematuro por incompetencia cervical se logra disminuir la morbilidad perinatal.

Palabras clave: INCOMPETENCIA CERVICAL/factores de riesgo, INCOMPETENCIA CERVICAL / diagnóstico, INCOMPETENCIA CERVICAL/cirugía.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Marco teórico.....	5
Materiales y Métodos.....	13
Resultados y Discusión.....	20
Conclusiones.....	31
Recomendaciones.....	32
Referencias bibliográficas.....	33
Anexos	